

## Esquema nacional de vacunación, Honduras 2023

Vacuna	Edad de aplicación						
	Recién nacido	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	4 años
<b>Niños</b>							
BCG 1	Dosis única						
Hepatitis B pediátrica 2	Dosis única						
Poliovirus Inactivada (VPI)		1era dosis	2da dosis				
Polio oral (bVOP o Sabin) 3				3era dosis		Refuerzo	
DPT-HepB-Hib (Pentavalente)		1era dosis	2da dosis	3era dosis			
Rotavirus 4		1era dosis	2da dosis				
Neumococo conjugada		1era dosis	2da dosis	3era dosis			
SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) 5					1era dosis	2da dosis	
Hepatitis A					Dosis única		
DPT						1er Refuerzo	2do Refuerzo
<b>Adolescentes y adultos</b>							
Hepatitis A	<b>Grupos en riesgo:</b> Trabajadores de la Salud Primer contacto: 1era dosis 6 meses después de 1era dosis: 2da dosis						
Hepatitis B	<b>Grupos en riesgo:</b> Primer contacto: 1era dosis Un mes después de 1era dosis: 2da dosis 6 meses después de 1era: 3era dosis Pacientes en diálisis y víctimas agresión sexual: 4 dosis						
Td (Toxoide tetánico difterico)	<b>11 años:</b> Refuerzo y luego 1 dosis cada 10 años <b>Embarazadas no vacunadas:</b> Primer contacto: 1era dosis Un mes después de 1era dosis: 2da dosis <b>Completar esquema de 5 dosis despues del embaraz</b> 3era dosis: 6 meses después de la 2da dosis 4ta dosis: 1 año después de la 3era dosis 5ta dosis: 1 año después de la 4ta dosis  <b>Grupos en riesgo:</b> Primer contacto: 1era dosis Un mes después de 1era dosis: 2da dosis 6 meses después de 2da dosis: 3era dosis Cada 10 años: refuerzo						
Tdap (Toxoide tetánico, difterico y vacuna antipertussis acelular)	<b>Embarazadas:</b> una dosis de refuerzo en situaciones de brote de Tos ferina <b>Otros grupos en riesgo:</b> Trabajadores de Salud, una dosis de refuerzo en situaciones de brote de Tos ferina						
VPH (Virus del Papiloma Humano)	<b>Adolescentes mujeres de 11 años:</b> Primer contacto: 1era dosis 6 meses después de 1ra dosis						
<b>Grupos en riesgo</b>							
DT pediátrica 6	<b>2da dosis: 4 meses</b> <b>3era dosis: 6 meses</b> <b>Refuerzo: 18 meses</b> <b>Refuerzo: 4 años</b>						
Poliovirus Inactivada (VPI)	<b>1era dosis: 2 meses</b> <b>2da dosis: 4 meses</b> <b>3era dosis: 6 meses</b>						
SRP (Sarampión y Rubéola y Parotiditis) con la cepa Jeryl Lynn	Una dosis a mayores de 5 años de edad no vacunados.						
Influenza 7	Población de 6 a 23 meses y enfermos crónicos de 2 a 59 años: Dosis anual en población de 6 meses a 8 años y aplicar 2da dosis con intervalo de 1 mes después de la primera dosis si previamente no ha sido vacunado. Trabajadores de la salud, trabajadores de granjas avícolas, embarazadas y adultos mayores de 60 años dosis única anual						
Fiebre Amarilla 8	Dosis única mayores de 1 año de edad (viajeros a zonas en riesgo de transmisión).						
COVID-19 Pediátrica	Población de 6 meses a 4 años, 11 meses y 29 días: Tres dosis del esquema primario con un intervalo de 28 días, entre la primera y la segunda dosis, dos meses después de la segunda se aplica la tercera dosis. Población de 5 a 11 años: Dos dosis del esquema primario con un intervalo de 28 días, inmunocomprometidos, recibirán una tercera dosis en 28 días después de la segunda dosis, un primer refuerzo, 5 meses después de la segunda o tercera dosis según corresponda,						
COVID-19 Adulto	Población de 12 años y más: Dos dosis del esquema primario con un intervalo de 28 días, inmunocomprometidos, recibirán una tercera dosis en 28 días después de la segunda dosis, un primer refuerzo, 3 meses después de la segunda o tercera dosis según corresponda el segundo refuerzo, cuatro meses después del primer refuerzo.						

**Viruela Simica**

Contactos estrechos de casos positivos confirmados y personal de salud de los equipos de respuesta rapida de 18 años y más, sin antecedente de vacuna recibiran dos dosis con un intervalo de cuatro semanas, Contactos estrechos de casos positivos confirmados y personal de salud de los equipos de respuesta rapida DE 50 años y más con antecedentes de vacuna, recibiran una dosis unica.

1.- BCG: Administrar a recién nacidos con peso mayor o igual a 2,500 gramos.

2.-Hepatitis B pediátrica: Administrar a recién nacidos no patológicos independiente del peso al nacer.

3.- Polio Oral ( VOP): También se aplica cada 4 años en jornadas nacionales a población de 6 meses a 4 años, 11 meses, 29 días de edad independientemente de su estado vacunal.

4.-Rotavirus: Primera y Segunda dosis aplicar a partir de los 2 meses de edad hasta menores de un año.

5.- SRP: También se aplica cada 4 años en campañas de seguimiento, en 2021 se aplicará a población de 1 a 5 años, 11 meses, 29 días de edad.

6.-DT pediátrica: aplicarla a niños con reacción adversa severa al componente Pertussis de la vacuna combinada DPT-HepB-Hib.

7.-Influenza: administrar 2 dosis separadas por un intervalo de 4 semanas a niños de 6 meses a 8 años, quienes estan recibiendo la vacuna por primera vez y quienes previamente fueron vacunados aplicar una dosis.

8.Paises en riesgo de transmision: Centro América: Panamá, Caribe: Trinidad y Tóbago, America del Sur:Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa,Guyana, Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela y África: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Republica Centroafricana, Republica Democratica del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudan, Sudan del Sur, Togo y Uganda.

Actualizado 12/10/22

Página 4